

Tabelle 1 | Impfkalender 2025 (Standardimmunisierungen mit Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern [mAk]); für Indikationsimpfungen wird auf Tabelle 2 verwiesen

A – Säuglinge, und Kleinkinder bis zum Alter von 59 Monaten (≤ 4 Jahre)														
Impfung/Immunsierung	Alter in Wochen			Alter in Monaten										
	0	4	6	2	3	4	5–7	8–10	11*	12	13–14	15	16–23	24–59
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8
Respiratorische Synzitial Viren	mAk (Einmaldosis) je nach Geburtsmonat ^a													
Rotaviren			G1 ^b	G2	(G3)									
Tetanus ^c				G1		G2				G3 ^f				
Diphtherie ^c				G1		G2				G3 ^f				
Pertussis ^c				G1		G2				G3 ^f				
Hib ^c – <i>H. influenzae</i> Typ b				G1		G2				G3 ^f				
Poliomyelitis ^c				G1		G2				G3 ^f				
Hepatitis B ^c				G1		G2				G3 ^f				
Pneumokokken ^{c,d}				G1		G2				G3 ^f				
Meningokokken B ^e				G1		G2				G3 ^f				
Meningokokken C										G1				
Masern, Mumps, Röteln										G1		G2		
Varizellen										G1		G2		

B – Kinder ≥ 5 Jahre, Jugendliche und Erwachsene								
Impfung	Alter in Jahren							
	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	60–74	ab 75
	U9	U10	U11/J1		J2			
Tetanus	A1		A2			A ^h		
Diphtherie	A1		A2			A ^h		
Pertussis	A1		A2			A3 ^h		
Poliomyelitis			A1					
Hepatitis B								
HPV – Humane Papillomviren			G1 ^g	G2 ^g				
Meningokokken C								
Masern						S ⁱ		
Mumps, Röteln								
Varizellen								
Pneumokokken							S ^k	
Herpes zoster							G1 ^l	G2 ^l
Influenza							S (jährlich) ^m	
COVID-19						Gx ⁿ	S (jährlich) ^m	
Respiratorische Synzitial Viren								S ⁿ

■ Empfohlener Impfzeitpunkt

■ Empfohlener Zeitraum für die Verabreichung der mAk

■ Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung und Verabreichung der mAk

a Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2 (3.–10. Lebenstag).

b Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

c Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

d Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft

e Gemäß Fachinformation besteht die Impfsreihe im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen

f Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate

g Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich

h Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

i Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

j Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist. Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 bis vorzugsweise 12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate

k Impfung mit PCV20

l 2 Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

m Jährliche Impfung im Herbst

n 1-malige Impfung mit einem proteinbasierten RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison


* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden

G Grundimmunisierung (G1–G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

mAk monoklonale Antikörper



G. Luner-Landtau
Fachärztin für Kinderheilkunde
und Jugendmedizin

40237 Düsseldorf
Rethelstraße 139
Tel.: 0211 624404
Fax: 0211 239 6161
Email: info@kinderarztinluner-landtau.de

Unser Terminfahrplan für Impfungen und Untersuchungen

4. – 8. Lebenswoche	U3 mit Hüftultraschall
Ab der 6. Lebenswoche	Rotaviren + (Rotateq, oral) 1. 6-fach Impfung (Vaxelis) + 1. Pneumokokken Impfung (Vaxneuvance)
8. Lebenswoche	1. Meningokokken B (Bexsero)
10. Lebenswoche	2. Rotavirus Impfung
Ab 3. – 4. Lebensmonat	U4 mit 3. Rotaviren + 2. 6-fach Impfung + 2. Pneumokokken Impfung
5. – 6. Lebensmonat	U5 mit Nierensonographie + 2. Meningokokken B (Bexsero) + Meningokokken ACWY (Nimenrix) + Sehtest Amblyopie-Screening
10. – 12. Lebensmonat	U6 mit 1. MMR* Impfung (Priorix)
12. – 15. Lebensmonat	3. 6-fach Impfung + 3. Pneumokokken Impfung
13. Lebensmonat	1. MMRV Masern, Mumps, Röteln, Windpocken (Priorix Tetra)
14. Lebensmonat	3. Meningokokken B (Bexsero) / 2. MMRV Impfung

**Bei Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung / Tagesmutter ist die MMR Impfung (Masern) Pflicht.*